

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

くしゃみ・鼻みず・鼻づまりに
パブロンAG錠 第2類医薬品
メキタジン配合 (総合かぜ薬)

◆パブロンAG錠は、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりをおさえるメキタジンをはじめ、8つの有効成分を配合した総合かぜ薬で、かぜの諸症状を効果的に改善します。
◆15才以上の大人用かぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	3錠	1日3回
15才未満	服用しないこと	

[注意]

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

①瓶口シールをはがして捨ててください。



②詰め物を取り出して捨ててください。
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると異物混入の原因になることがあります)

効能

かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

くしゃみ・鼻みず・鼻づまりに



のどの痛み・発熱等に



せき・たんに



しょうじょう ちゅうい 使用上の注意	
① 次の人は 服用しないでください。	
(1) 本剤による アレルギー症状を 起こしたことがある人。	
(2) 本剤 又は 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を 服用して ぜんそくを 起こしたことがある人。	
② 本剤を 服用している間は、次の いずれの 医薬品も 服用しないでください。	
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を 含有する 内服薬（鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬）	
③ 服用後、乗物 又は 機械類の 運転操作を しないでください。（眠気が あらわれることがあります）	
④ 服用時は 飲酒 しないでください。	
⑤ 長期連用 しないでください。	

ようほう ようりょう 用法・用量		
次の量を 食後 なるべく 30分以内に 服用してください。		
ねんれい 年齢	いっかいりょう 1回量	ふくようかいすう 服用回数
さいいじょう 15歳以上	じょう 3錠	にち かい 1日3回
さいみまん 15歳未満	ふくよう 服用しないこと	

(1) 定められた 用法・用量を 厳守してください。
(2) めれた手等で 触れた錠剤は びんに もどさないでください。（変色等の原因となり、品質が変わることがあります）

さいしょ しょう 最初に使用するときに
(1) 瓶口シールを はがして 捨ててください。
(2) 詰め物を取り出して 捨ててください。
(この詰め物は 輸送時の 錠剤の 破損を ふせぐためのものです。
これを びんに 出し入れすると 異物混入の原因になることがあります)

こう のう 効能
かぜの 諸症状（鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和